

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Quinta Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral III - MTM124
 Prof. Júlio César do Espírito Santo

22 de janeiro de 2016

(1) Esboce o campo de vetores $\mathbf{F}(x, y, z)$ em cada um dos itens abaixo.

- | | |
|--|---|
| (a) $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ | (b) $\mathbf{F}(x, y) = -x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ |
| (c) $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j}$ | (d) $\mathbf{F}(x, y) = 3\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ |
| (e) $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1/2}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})$ | (f) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + z\mathbf{k}$ |
| (g) $\mathbf{F}(x, y, z) = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ | (h) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ |
| (i) $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ | (j) $\mathbf{F}(x, y, z) = 2\mathbf{k}$ |

(2) Se $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{c}{\|\mathbf{r}\|^2}\mathbf{u}$, onde $\mathbf{u} = (1/\|\mathbf{r}\|)\mathbf{r}$ é um vetor unitário tendo a mesma direção que \mathbf{r} , verifique que $\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla(-c/\|\mathbf{r}\|)$.

(3) Encontre uma função potencial para

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\frac{gMm}{\|\mathbf{r}\|^2}\mathbf{u}.$$

(4) Encontre um campo conservativo que tenha o seguinte potencial

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (a) $f(x, y, z) = x^2 - 3y^2 + 4z^2$ | (b) $f(x, y, z) = \text{sen}(x^2 + y^2 + z^2)$ |
| (c) $f(x, y, z) = \text{arctg}(xy)$ | (d) $f(x, y, z) = y^2 e^{-3x}$ |

(5) Nos itens abaixo, calcule $\nabla \times \mathbf{F}$ e $\nabla \cdot \mathbf{F}$.

- | | |
|--|--|
| (a) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 z\mathbf{i} + y^2 x\mathbf{j} + (y - 2z)\mathbf{k}$ | (b) $\mathbf{F}(x, y, z) = (3x + y)\mathbf{i} + xy^2 z\mathbf{j} + xz^2\mathbf{k}$ |
| (c) $\mathbf{F}(x, y, z) = 3xyz^2\mathbf{i} + y^2 \text{sen}(z)\mathbf{j} + xe^{2z}\mathbf{k}$ | (d) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3 \ln z\mathbf{i} + xe^{-y}\mathbf{j} - (y^2 + 2z)\mathbf{k}$ |

(6) Verifique as seguintes identidades.

- | | |
|---|---|
| (a) $\nabla \times (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}$ | (b) $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla \cdot \mathbf{G}$ |
| (c) $\nabla \times (f\mathbf{G}) = f(\nabla \times \mathbf{G}) + (\nabla f) \times \mathbf{G}$ | (d) $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - (\nabla \times \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F}$ |

R.4a. $\nabla f = 2xi - 6yj + 8zk$; 4c. $F(x, y) = (1 + x^2 y^2)^{-1}(yi + xj)$; 5a. $i + x^2 j + y^2 k, 2xz2yx + 2$; 5c. $-y^2 \cos(x)i + (6xyz - e^{2z})j - 3xz^2 k, 3yz^2 + 2y \text{sen}(z) + 2xe^{2z}$

Bom Estudo!